


Unterscheidungsmerkmale der drei Arten

	Schönflossenbarbe (<i>Epalzeorhynchus kalopterus</i>)	Siamesische Rüsselbarbe (<i>Crossocheilus siamensis</i>)	Längsband Saugbarbe (<i>Garra cambodgiensis</i>)
Gestalt	<ul style="list-style-type: none"> Der Körper ist sehr langgestreckt (Torpedoförmig) 	<ul style="list-style-type: none"> Körper ist sehr langgestreckt (Torpedoförmig) 	<ul style="list-style-type: none"> Körper sehr langgestreckt (Torpedoförmig) etwas gedrungener als die andere beiden Arten
Färbung	<ul style="list-style-type: none"> Der Rücken ist braun gefärbt, der restliche Körper ist hellbraun Bauch weiß gefärbt 	<ul style="list-style-type: none"> Die Färbung des Rückens ist gelblich-braun, an den Seiten heller Der Bauch ist weiß 	<ul style="list-style-type: none"> Färbung des Rückens braun Bauch ist hellgelb bis weiß
Maul	<ul style="list-style-type: none"> 2 Paar Barteln 1 Paar an der Schnauzenspitze und 1 Paar in den "Mundwinkeln" Besitzt eine fleischige Warze (bewegliches Hautläppchen) zwischen rostraler Bartel und "Tränensackrinne" 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paar Barteln Nur 1 Paar Barteln an der Schnauzenspitze 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Paar Barteln Maul ist zu einem Saugmaul ausgebildet an dem die Barteln sitzen Kann sich mit dem Saugmaul an Gegenständen ansaugen
Flossen	<ul style="list-style-type: none"> Die Brustflossen sind rötlich Oberer Teil der Rückenflosse ist dunkler, genau wie bei der Afterflosse und den Bauchflossen Alle Flossen können farblos aber auch rötlich sein Rückenflosse und Afterflosse Sichelförmig geschwungen Weißer Spitzen an Rücken-, Buch- und Afterflosse 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Flossen sind transparent und können leicht gelblich gefärbt sein Rückenflosse und Afterflosse nicht Sichelförmig sondern gerade 	<ul style="list-style-type: none"> Flossen beim Männchen kräftig gelb gefärbt mit rötlichen Spitzen Unterer Teil der Rückenflossen dunkler Rückenflosse sh. Bild 
Schwanzflosse	<ul style="list-style-type: none"> mit Längsbinde Farblos aber auch etwas rötlich sein 	<ul style="list-style-type: none"> mit Längsbinde Farblos (leicht gelblich) 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Längsbinde Schwanzflosse gelblich bis bräunlich Spitzen rötlich gefärbt 
Längsbinde	<ul style="list-style-type: none"> 2 Längsbinden Eine Schwarze reicht von der Schnauzenspitze bis zum Ende der Schwanzflosse Darüber ein schmales goldfarbendes Band das nur bis zur Schwanzwurzel reicht 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Längsbinde Die Schwarze Längsbinde reicht von der Schnauzenspitze bis zum Ende der Schwanzflosse 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Längsbinden Ein dunkelbraunes Längsband von der Schnauzenspitze was nur bis zur Schwanzwurzel reicht Darüber ein schmales, gelblich bis hellbraunes Band was auch nur bis zur Schwanzwurzel reicht
Schwimmverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Kann frei im Wasser stehen 	<ul style="list-style-type: none"> Kann zwar frei im Wasser stehen aber nicht so gut wie <i>E. kalopterus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kann nicht frei im Wasser stehen, sinkt ohne eine Schwimmbewegung auszuführen zu Boden (ähnlich wie die Siamesische Saugschmerle) Wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Schwimmblase nicht richtig ausgebildet ist
Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> Verhalten ähnelt sehr dem von anderen <i>Epalzeorhynchus</i>-Arten 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarmfisch Gegenüber anderen Fischen friedlich Gegenüber Artgenossen manchmal aber etwas zänkisch 	<ul style="list-style-type: none"> Gegenüber anderen Fischen meist friedlich Gegenüber Artgenossen und ähnlichen Fischen manchmal recht zänkisch
Algenfresser ?	<ul style="list-style-type: none"> Frißt kaum Algen 	<ul style="list-style-type: none"> Junge Tiere sind sehr gute Algenfresser, ältere Tiere werden etwas "faul" 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr guter Algenfresser! Nach eigenen Erfahrungen einer der besten Algenfresser, sogar noch besser als <i>C. siamensis</i>